



LUTTE CONTRE LA BVD

Bovins Lait & Viande

Chaque année, plus de 1 élevage sur 3 connaît un passage viral de la BVD (maladie des muqueuses). Le virus circule facilement d'un élevage à l'autre et peut représenter une perte de 60 € par bovin par an.

Suivre un plan de lutte permet d'anticiper les problèmes et de limiter les risques.



➤ Quels objectifs ?

- Détecter une contamination précocement
- Compléter les résultats d'introduction
Une vache gestante est contrôlée mais pas le veau naissant. Ce veau peut être un IPI (Infecté Permanent Immunotolérant) qui s'est infecté dans le ventre de sa mère au début de la gestation. Ces animaux sont contagieux dès leur naissance et le restent toute leur vie.
- Compléter les résultats d'avortements où les mères peuvent être ou non immunisées contre la BVD
- Eliminer les IPI le plus rapidement possible avant d'avoir d'autres veaux naissants IPI

➤ Quand ?

Une inscription annuelle à une action volontaire en début d'année

Pour les laitiers : un suivi toute l'année

Pour les allaitants : un suivi 1 fois par an

➤ Qui participe ?

- Les éleveurs
- Le GDS
- Le Contrôle Laitier ou Bovins Croissance
- Le vétérinaire
- Le Laboratoire de Touraine

➤ Comment s'organise le service ?

Pour les laitiers :

- L'éleveur ou le peseur du Contrôle Laitier réalise les prélèvements de lait en tank 1 fois par trimestre
- Pour ses adhérents, le Contrôle Laitier transfère les échantillons au Laboratoire de Touraine qui réalise les analyses

Pour les allaitants :

- Le vétérinaire réalise par sondage les prises de sang sur le cheptel de renouvellement (8-15 mois) à raison de 5 prises de sang par lot de 30 animaux
- Le vétérinaire transmet les prises de sang au Laboratoire de Touraine qui réalise les analyses

➤ Quels outils pour l'éleveur ?

- Un protocole d'actions adapté à l'élevage
- Un programme d'intervention en cas de suspicion

➤ Votre contact

Laure Malherbe ou Laëticia Pérochon
au 02 47 48 37 58